

KLINIK FOR IMPLANTAT-, TAND-, OG KÆBEKIRURGI

v/ specialtandlæge, dr. odont. OLE DONATSKY &

TANDLÆGERNE SEIDELIN OG MØLLER ApS

SMEDELUNDSGADE 18, 1.,
4300 HOLBÆK - 5944 2811



EFTER OPERATIONEN

VEJLEDNING for patienter, der har fået foretaget tandudtrækning eller operation i mundhulen.

ALMINDELIGE FORHOLDSREGLER

Undgå de første timer efter behandlingen større fysiske anstrengelser. De iturevne blodkar skal have ro til at lukke sig, så der kan danne sig en prop af blod, som indleder helingen. Undlad at berøre såret med tungen, finger og lign. Undgå at suge i såret.

MUNDSKYLNING OG TANDBØRSTNING

Skyl ikke munden de første 2 timer efter behandlingen, idet helingsproces herved kan forstyrres. Derefter skylles munden forsigtigt med *Klorhexidin 0,1%* 3 gange dagligt i en uge. Tandbørstning med blød børste kan og bør foretages, som sædvanligt, blot man passer på ikke at komme for nær såret.

KOSTEN

Undgå at spise eller drikke de første 2 timer efter behandlingen. Anvend kold, flydende kost det første døgn. Derefter kold og varm, blød kost indtil kontrol og trådfjernelse en uge efter behandlingen. Almindelig hård kost kan som reglen anvendes, når trådene er fjernet.

SMERTER

Når bedøvelsen er væk, vil man ofte kunne mærke ømhed eller lette smerter. For at lindre smerterne, medgives recept på stærkere smertestillende tabletter til anvendelse de første dage efter behandlingen.

Derefter anbefales almindelige smertestillende håndkøbstabletter som f.eks. *Paracetamol*, *Pinex* eller *Panodil* - 2 tabletter 3-4 gange dagligt efter behov.

HÆVELSE

Hævelse omkring kæben og i ansigtet de første 3-5 dage efter behandling er en almindeligt forekommende reaktion på behandlingen. Ved tiltagende, voldsom hævelse efter de første dage, bør De kontakte klinikken eller skadestue.

BLØDNING

Den første dag kan der sive blod ud fra såret uden, at dette bør give grund til ængstelse. Ved kraftigere blødning kan De tage en ren gazetampon eller et rent lommetørklæde at lægge over såret. Bid sammen således, at gazen trykker sårkanterne. Hold derefter munden lukket i ½ time. Denne procedure kan gentages et par gange. Ved tvivlstilfælde eller i tilfælde af vedvarende efterblødning bedes De henvende Dem på klinikken eller skadestue. Blålig-gullig misfarvning af huden kan ofte opstå i dagene efter behandlingen og vil fortage sig i løbet af 1-2 uger.

RYGNING

Det anbefales, at standse/nedsætte tobaksforbruget indtil kontrol og trådfjernelse en uge efter behandlingen. Derved understøttes helingsprocessen og evt. komplikationer i forbindelse med sårheling forebygges.